



基督教香港信義會
社會服務部



願 願 | 信 信 | 同 同

牙齒閃閃—牙科治療計劃
吸毒與牙齒健康記者會
2016年9月20日



記招流程

- 1.** 吸毒對牙齒的影響
- 2.** 吸毒與牙齒健康調查結果及分析
- 3.** 牙齒閃閃牙科治療計劃
- 4.** 吸毒個案分享
- 5.** 總結及發問時間



1. 吸毒對牙齒的影響

冰毒的主要禍害

- 失眠
- 激動不安
- 驚惶及精神錯亂
- 焦慮及緊張
- 冰瘡
- 抑鬱
- 心臟衰竭
- 因產生幻覺及被迫害的感覺而引致暴力行為
- 如服用重劑量，會導致中毒性精神病、抽搐、昏迷、腦出血甚至死亡

冰毒對牙齒的影響

吸食冰毒的影響	症狀和特徵
<ul style="list-style-type: none">嗜甜，多服易致蛀牙的食物和含糖飲料口腔衛生差，忽視口腔自理增加在唾液的酸性 pH 值，減少緩衝作用	<ul style="list-style-type: none">嚴重的蛀牙（類似嬰幼兒齲病，俗稱蛀牙）增加口腔細菌的數量
<ul style="list-style-type: none">損壞唾液腺造成唾液不足 (Hyposalivation)	<ul style="list-style-type: none">口腔乾燥症加速蛀牙情況
<ul style="list-style-type: none">血管收縮導致缺乏營養，血液和血氧流動不足，影響牙齒及牙週組織缺乏基本的口腔衛生護理	<ul style="list-style-type: none">牙周疾病
<ul style="list-style-type: none">血管收縮影響治療過程免疫力受損接觸有毒物質	<ul style="list-style-type: none">口腔發炎、感染、損傷、潰瘍
<ul style="list-style-type: none">吸毒增加神經肌肉活動增加磨牙機會：因為緊張和焦慮的肌肉緊張當感覺到緊張、焦慮時會咬合牙齒	<ul style="list-style-type: none">甩牙、斷牙顫下頷關節紊亂 Temporomandibular disorders (TMD)（女性比男性發病率高）

圖表一：吸毒冰毒對口腔影響的綜述

Rapid tooth decay ("meth mouth")

冰口



網上資料圖片

咳水的禍害


- 失憶
- 反應遲鈍
- 呼吸減慢及減弱
- 腦部受損
- 中毒、物質關聯性精神障礙
- 牙齒潰爛
- 吸食者往往低估其成癮程度而不斷飲用，令危機增加




個案牙齒圖片：飲了8年咳水



基督教香港信義會
社會服務部



四十年
踴躍 | 信誼 | 同行




2. 吸毒與牙齒健康 調查結果及分析

調查背景資料

- 天朗中心於**2016**年**7**月至**8**月期間，以電話形式訪問了**246**名中心現有的個案。
- 共**124**名完成有關電話訪問，回覆率達**50.4 %**。
- 受訪個案平均年齡為**30.7**歲，年紀最小**15**歲、最大為**44**歲。


受訪者主要吸食毒品的類型



受訪者數目 (N=124)

- 氯胺酮
- 甲基安非他明
- 咳水
- 可卡因
- 其他：海洛英、大麻、安眠藥

受訪吸毒人士的牙齒狀況





基督教香港信義會
社會服務部



願 願 | 信 信 | 同 同

靈愛中心

3. 牙齒閃閃—牙科治療計劃簡介

服務之實證理念

理念一：

為吸食冰毒人士或戒毒復康人士直接提供牙科治療服務，有助及早識別吸食冰毒人士和提供適當的治療和協助 (Lopresti, Ngo, Tocchio, 2013)。

理念二：

研究發現，戒毒復康中的人士存在以下的想法，以至抗拒尋求牙科治療，例如：低自尊感、尷尬、針筒恐懼症、財務緊拙、否定有關牙科治療的需要 (Robinson, Acquah & Gibson, 2005; Brown, Krishnan, Hursh, Johanson, Page & Shiboski, 2012)。

計劃介紹

目標：

- 重建牙齒 · 重建人生

治療內容：

- 牙齒檢查、補牙、假牙或植牙

對象：

- 有意戒毒人士

服務流程

申請靈愛服務：進行登記和評估

獲社工推薦及通過面試

成功申請者將獲安排牙醫檢查

完成靈愛戒毒療程

醫療評估和安排牙科治療

200小時禁毒預防義工服務



靈愛中心



牙齒閃閃—

牙科治療計劃簡介




2446-1999 (聯絡負責社工)



牙醫分享計劃內的治療手法

人工植牙流程



醫師評估

植入人工牙根

依個人狀況進行
附加手術

等待骨結合完成

裝戴上假牙



基督教香港信義會
社會服務部



40
踴躍 | 信 | 門



4.吸毒個案分享



5. 總結及發問時間

Reference

Brown, C., Krishnan, S., Hursh, K., Yu, M., Johnson, P., Page, K., & Shiboski, C. H. (2012). Dental disease prevalence among methamphetamine and heroin users in an urban setting: a pilot study. *The Journal of the American Dental Association*, 143, 992-1001

Lopresti, Ngo, Tocchio, 2013. Methamphetamine use and oral health: management and treatment and considerations. *Canadian Journal of Dental Hygiene*, 47,176-181

Robinson, P. G., Acquah, S., & Gibson, B. (2005). Drug users: oral health-related attitudes and behaviours. *British dental journal*, 198, 219-224.

香港禁毒處網頁 Retrieved from <http://www.nd.gov.hk/tc/druginfo.htm>

香港衛生署2011年口腔健康調查 Retrieved from http://www.toothclub.gov.hk/chi/pdf/Oral_Health_Survey_2011/HIGHLIGHTS_Traditional_WC_AG_20141111.pdf